

FFH-Monitoring 2008: *Maculinea arion*

Ergebnisse

Termine

Tab. 1: Darstellung der Termine der Begehungen

Untersuchungsgebiet	1. Begehung	2. Begehung
Hemmersdorf, Dolinen	01.07.2008	04.07.2008
Wolferskopf, Jesuitenstücke	01.07.2008	04.07.2008
Reinheim, Rebenklamm	02.07.2008	04.07.2008
Differten, Eulenmühle	01.07.2008	04.07.2008

Gezählte Falter

Tab.2: Darstellung der Ergebnisse der Zählung der Falter von *Maculinea arion*

Untersuchungsgebiet	1. Begehung (Gesamt (♂♂, ♀♀))	2. Begehung (Gesamt (♂♂, ♀♀))
Hemmersdorf, Dolinen	9 (7,2)	6 (4,2)
Wolferskopf, Jesuitenstücke	5 (4,1)	9 (8,1)
Reinheim, Rebenklamm	2 (1,1)	1 (1,0)
Differten, Eulenmühle	5 (3,2)	12 (5,7)

Habitatqualität

Hemmersdorf, Dolinen

Tab. 3: Darstellung der zugeteilten Wertstufen der Habitatqualität für Hemmersdorf, Dolinen

Kriterien / Wertstufe	A	B	C
Habitatqualität	hervorragend	gut	mittel bis schlecht
Flächenanteil potenzielles Larvalhabitat [%] (%-genaue Angabe, kartografisch festhalten)		X	
Anteil offener Boden/Grus/Steine/Fels[%] (in 5%-Schritten schätzen)		X	
mittlere obere Krautschichthöhe			X
Anzahl voll besonnter Wirtspflanzen		X	
Beeinträchtigungen	keine bis gering	mittel	stark
Strauchschichtdeckung im (potenziellen) Larvalhabitat [%] (in 5%-Schritten schätzen)			X
Beweidungsaufgabe bzw. Reduktion der -frequenz			X
Nährstoffanreicherung	X	entfällt	

Wolferskopf, Jesuitenstücker

Tab. 4: Darstellung der zugeteilten Wertstufen der Habitatqualität für die Jesuitenstücker

Kriterien / Wertstufe	A	B	C
Habitatqualität	hervorragend	gut	mittel bis schlecht
Flächenanteil potenzielles Larvalhabitat [%] (%-genaue Angabe, kartografisch festhalten)		X	
Anteil offener Boden/Grus/Steine/Fels[%] (in 5%-Schritten schätzen)			X
mittlere obere Krautschichthöhe			X
Anzahl voll besonnter Wirtspflanzen		X	
Beeinträchtigungen	keine bis gering	mittel	stark
Strauchschichtdeckung im (potenziellen) Larvalhabitat [%] (in 5%-Schritten schätzen)	X		
Beweidungsaufgabe bzw. Reduktion der -frequenz	X		
Nährstoffanreicherung	X	entfällt	

Reinheim, Rebenklamm

Tab. 5: Darstellung der zugeteilten Wertstufen der Habitatqualität für Reinheim, Rebenklamm

Kriterien / Wertstufe	A	B	C
Habitatqualität	hervorragend	gut	mittel bis schlecht
Flächenanteil potenzielles Larvalhabitat [%] (%-genaue Angabe, kartografisch festhalten)			X
Anteil offener Boden/Grus/Steine/Fels[%] (in 5%-Schritten schätzen)			X
mittlere obere Krautschichthöhe			X
Anzahl voll besonnter Wirtspflanzen		X	
Beeinträchtigungen	keine bis gering	mittel	stark
Strauchschichtdeckung im (potenziellen) Larvalhabitat [%] (in 5%-Schritten schätzen)		X	
Beweidungsaufgabe bzw. Reduktion der -frequenz	X		
Nährstoffanreicherung	X	entfällt	

Differten, Eulenmühle

Tab. 6: Darstellung der zugeteilten Wertstufen der Habitatqualität für Differten, Eulenmühle

Kriterien / Wertstufe	A	B	C
Habitatqualität	hervorragend	gut	mittel bis schlecht
Flächenanteil potenzielles Larvalhabitat [%] (%-genaue Angabe, kartografisch festhalten)	X		
Anteil offener Boden/Grus/Steine/Fels[%] (in 5%-Schritten schätzen)			X
mittlere obere Krautschichthöhe			X
Anzahl voll besonnter Wirtspflanzen	X		
Beeinträchtigungen	keine bis gering	mittel	stark
Strauchschichtdeckung im (potenziellen) Larvalhabitat [%] (in 5%-Schritten schätzen)		X	
Beweidungsaufgabe bzw. Reduktion der -frequenz			X
Nährstoffanreicherung		entfällt	X