

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) (9180)

Kriterien für die Bewertung des Erhaltungszustandes

Waldbesitzer:

Abt./U.Abt./Bestand (Bei Wald mit periodischer Betriebsplanung):

Gem./Flur/Flurstück-Nr. (Bei Wald ohne periodische Betriebsplanung):

	A – hervorragend	B – gut	C – mittel bis schlecht
LR-typische Strukturen	Hervorragende Ausprägung	gute Ausprägung	mittlere - schlechte Ausprägung
a) Schichtung LR-typischer Gehölze	Alle drei Schichten; eine davon muss starkes oder sehr starkes Baumholz sein.	Mindestens zwei Schichten. Bei Vorhandensein von starkem oder sehr starkem Baumholz ist eine Schicht ausreichend.	Eine der Schichten
b) Altbäume/Biotopbäume LR-typischer Gehölze	≥ 6 / ha	1-5 / ha	< 1 / ha
c) Starkes Totholz	> 3 Stück / ha	1-3 Stück / ha	< 1 Stück / ha
LR-typisches Gehölzarteninventar und spezielle wertbestimmende Arten oder Artengruppen	<p>Haupt- und Nebenbaumarten: <i>Acer pseudoplatanus</i>, <i>Ulmus glabra</i>, <i>Tilia platyphyllos</i>, <i>Quercus petraea</i>, <i>Carpinus betulus</i>, <i>Fraxinus excelsior</i>, <i>Tilia cordata</i>, <i>Acer platanoides</i></p> <p>Strauchschicht: <i>Corylus avellana</i>, <i>Crataegus spec.</i>, <i>Lonicera xylosteum</i>, <i>Viburnum opulus</i>¹, <i>Salix caprea</i>¹, <i>Prunus padus</i>, <i>Ribes alpinum</i>, <i>Ribes uva-crispa</i>, <i>Rubus idaeus</i>¹, <i>Daphne mezereum</i>, <i>Sambucus nigra</i>, <i>Sambucus racemosa</i>, <i>Sorbus aria</i>, <i>Sorbus aucuparia</i>¹</p> <p>Fett: Dominanzbildner , ¹häufig im Vorwald und/oder Pionierwald</p> <p>Krautschicht: <u>wertgebende Arten:</u> <i>Actaea spicata</i>, <i>Aruncus dioicus</i>, <i>Asplenium scolopendrium</i>, <i>Dryopteris affinis</i>, <i>Polystichum aculeatum</i>, <i>Polystichum lonchitis</i>, <i>Polystichum setiferum</i>, <i>Polystichum x bicknellii</i>; <u>typische Arten:</u> <i>Atropa belladonna</i>, <i>Cardamine impatiens</i>, <i>Geranium robertianum</i>, <i>Mercurialis perennis</i>, <i>Stachys sylvatica</i>, <i>Alliaria petiolata</i>, <i>Aegopodium podagraria</i>, <i>Veronica sublobata</i></p>		
a) LR-typische Baumarten (in Prozent der Baumartendeckung)	vorhanden > 90 %	weitgehend vorhanden >80-90 %	teilweise fehlend >50-80 % <u>oder</u> Bestände mit LR-typisch ausgebildeter Krautschicht, deren Baumschicht sich nicht aus Haupt/Nebenbaumarten zusammensetzt (z. B. Robinie, Fichte)
Nutzungsbedingte Dominanzverschiebung	<input type="checkbox"/>		
b) LR-typische Arten Krautschicht (in Prozent der Krautschicht)	Artenkombination in der Krautschicht ist eindeutig lebensraumtypisch	Lebensraumtypische Artenkombination in der Krautschicht ist verändert	Lebensraumtypische Artenkombination in der Krautschicht ist stark verändert
Beeinträchtigungen	gering	mittel	stark
a) Eutrophierungs- / Störzeiger (Arten konkret nennen)	< 25 %	25-50 %	> 50 %

b) Befahrung	Keine oder geringe Schäden	Mittlere Schäden	Starke Schäden
--------------	----------------------------	------------------	----------------

Weitere Beeinträchtigungen: (nur vermerken soweit relevant)	
Durchschneidung	
Freizeit- und Erholungsnutzung	
Erheblicher Wildverbiss	
Müllablagerungen	
Grünschnittablagerungen	

Gesamtbewertung der BT-Fläche (Aggregation obiger Einzelbewertungen nach Anleitung):

Maßnahmenvorschläge:

Stand: 06.03.2008