

Eichen-Ulmen-Eschenwälder (91F0)

Kriterien für die Bewertung des Erhaltungszustandes

Waldbesitzer:

Abt./U.Abt./Bestand (Bei Wald mit periodischer Betriebsplanung):

Gem./Flur/Flurstück-Nr. (Bei Wald ohne periodische Betriebsplanung):

	A - hervorragend	B – gut	C- mittel bis schlecht
LR-typische Strukturen	Hervorragende Ausprägung	gute Ausprägung	mittlere - schlechte Ausprägung
a) Schichtung LR-typischer Gehölze	Mindestens zwei Schichten; bei Vorhandensein von starkem Baumholz ist eine Schicht ausreichend	Mindestens zwei Schichten; bei Vorhandensein von geringem bis mittlerem Baumholz ist eine Schicht ausreichend.	Eine der Schichten
b) Altbäume/Biotopbäume LR-typischer Gehölze	≥ 6 / ha	1-5 / ha	< 1 / ha
c) Starkes Totholz	> 3 Stück / ha	1-3 Stück / ha	< 1 Stück / ha
LR-typisches Gehölzarteninventar und Spezielle wertbestimmende Arten oder Artengruppen	Baum- und Strauchschicht: <i>Alnus glutinosa</i>, <i>Fraxinus excelsior</i>¹, <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i>, <i>Carpinus betulus</i>, <i>Acer pseudoplatanus</i>, <i>Prunus padus</i>, <i>Viburnum opulus</i>, <i>Cornus sanguinea</i>, <i>Ribes rubrum</i>, <i>Crataegus spec.</i>, <i>Euonymus europaeus</i>, <i>Salix caprea</i>¹, <i>Rhamnus cathartica</i>, <i>Rubus caesius</i>¹, <i>Clematis vitalba</i>, <i>Humulus lupulus</i>, <i>Acer campestre</i>, <i>Hedera helix</i> fett: Dominanzbildner, ¹ häufig im Vorwald und/oder Pionierwald <i>kursiv:</i> wertgebende Arten Krautschicht: <i>Lamium maculatum</i> , <i>Cruciata laevipes</i> , <i>Corydalis cava</i> , <i>Corydalis solida</i> , <i>Adoxa moschatellina</i> , <i>Anemone ranunculoides</i> , <i>Veronica sublobata</i> , <i>Primula elatior</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Silene dioica</i> , <i>Elymus caninus</i> , <i>Festuca gigantea</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Glechoma hederacea</i> , <i>Circaea lutetiana</i> , <i>Angelica sylvestris</i>		
a) LR-typische Baumarten (in Prozent der Baumartendeckung)	vorhanden > 90 %	weitgehend vorhanden >80-90 %	teilweise fehlend >50-80 %
Nutzungsbedingte Dominanzverschiebung	<input type="checkbox"/>		
b) LR-typische Arten Krautschicht (in Prozent der Krautschicht)	Artenkombination in der Krautschicht ist eindeutig lebensraumtypisch	Lebensraumtypische Artenkombination in der Krautschicht ist verändert	Lebensraumtypische Artenkombination in der Krautschicht ist stark verändert
Beeinträchtigungen	gering	mittel	stark
a) Störzeiger	< 25 %	25 –50 %	> 50 %
	Störzeiger: <i>Helianthus tuberosus</i> , <i>Heracleum mantegazzianum</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Reynoutria japonica</i>		
b) Befahrung	keine Hinweise	Hinweise auf geringfügige Auswirkungen	Hinweise auf starke Auswirkungen
c) Wasserregime	keine oder geringe Schäden	mittlere Schäden	starke Schäden

Weitere Beeinträchtigungen: (nur vermerken soweit relevant)	
Durchschneidung	
Freizeit- und Erholungsnutzung	

Erheblicher Wildverbiss	
Müllablagerungen	
Grünschnittablagerungen	

Gesamtbewertung der BT-Fläche (Aggregation obiger Einzelbewertungen nach Anleitung):

Maßnahmenvorschläge:

Stand: 06.03.08