

Fotodokumentation

Teil 2: Biototypen und Gewässerstruktur

In dieser Dokumentation werden die typischen Biototypen und Landschaftsstrukturen des Kerngebietes gezeigt.

Grünlandnutzung



Extensive Beweidung am Alsbach-Oberlauf



Extensive Beweidung an der Merch



Beweidung von Nassstandorten an der ILL bei Heistermühle, Negativ-Beispiel



Beweidung am Bröttelhümes, Negativ-Beispiel, Management ändern !!



Beweidung am Firbach, Negativ-Beispiel, Management ändern !!



Extensive Wiesennutzung im Bereich der ILL-Quelle



Nasswiesen mit Geflecktem Knabenkraut (*Dactylohriza majalis*) am Rübendellbach



Wechselfeuchte Wiesen mit Teufelsabbiß (*Succisa pratensis*) am Sulzbach



Extensiv genutzte Wiesenlandschaft am Bruchelsbach



Nassbrachen mit Sumpf-Dotterblume (*Caltha palustris*) am Wiesbach



Pestwurzflur im Alsbachtal zwischen Mapingen und Berschweiler



Brachgefallene Nasswiesen am Bruchelsbach



Brachgefallene Nasswiesen mit Neophytenflur an der ILL bei Eppelborn



Pestwurzflur mit Riesenbärenklau (*Heracleum mantegazzianum*) an der ILL



Naturnaher, eigendynamischer Gewässerlauf am Alsbach



Brachgefallener Auenbereich an der ILL mit Brennnesselfluren



Unterlauf der ILL, naturnaher Bachlauf mit Neophytenflur



Naturnaher Bachlauf am Ellmachsbach



Merch, naturnaher Bach im Mittellauf



Merch, starke Erosion am Oberlauf



Hochwasser 2011 am Uchtelbach



Hochwasser 2011 am Mittellau der ILL bei Heistermühle



Hochwasser 2011 an der ILL-Mündung



Biberdamm an der Merch



Aufstau durch den Biber an der Merch



Aufstau durch den Biber am Rohrbach



Aufstau der ILL durch den Biber zwischen Urexweiler und Hirzweiler



Naturnaher Bachlauf am Rohrbach