

**Tab. 24: Typenbezogene Flächenveränderungen von 1994 nach 2011
Was ist aus den Typen von 1994 geworden?**

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|---|----------------|-------------|---|
| Wälder | | | |
| Bach- und Quell-Erlen- Eschenwald | 8,02 | 85,3% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,61 | 6,5% | sonstige Laubwälder |
| | 0,45 | 4,8% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,16 | 1,7% | Schlagfluren |
| | 0,05 | 0,6% | Grünlandbrache |
| | 0,03 | 0,3% | Freizeitgelände |
| | 0,02 | 0,3% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,02 | 0,2% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,02 | 0,2% | naturferne Teiche |
| | 0,01 | 0,1% | naturnahe Teiche |
| | 9,40 | | |
| Forste und standortfremde Gehölze | 20,72 | 40,7% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 14,66 | 28,8% | sonstige Laubwälder |
| | 5,15 | 10,1% | Baumhecken |
| | 3,13 | 6,1% | Schlagfluren |
| | 1,49 | 2,9% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 1,30 | 2,6% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 1,27 | 2,5% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,85 | 1,7% | Freizeitgelände |
| | 0,70 | 1,4% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,50 | 1,0% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,32 | 0,6% | Grünlandbrache |
| | 0,24 | 0,5% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,19 | 0,4% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,18 | 0,4% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,09 | 0,2% | naturferne Teiche |
| | 0,04 | 0,1% | Acker |
| | 0,03 | 0,1% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,02 | 0,0% | naturnahe Teiche |
| | 0,01 | 0,0% | magere Fettweide |
| | 0,00 | 0,0% | Nasswiese |
| | 50,87 | | |
| Schlagfluren | 2,14 | 58,8% | sonstige Laubwälder |
| | 0,94 | 25,7% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,27 | 7,5% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,13 | 3,7% | Schlagfluren |
| | 0,09 | 2,5% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,06 | 1,5% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,01 | 0,2% | Baumhecken |
| | | 3,64 | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|--|----------------|---------------------|---|
| sonstige Laubwälder | 88,77 | 92,4% | sonstige Laubwälder |
| | 1,97 | 2,1% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 1,44 | 1,5% | Baumhecken |
| | 0,72 | 0,8% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,70 | 0,7% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,53 | 0,5% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,40 | 0,4% | Schlagfluren |
| | 0,31 | 0,3% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,24 | 0,2% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,24 | 0,2% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,20 | 0,2% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,16 | 0,2% | Freizeitgelände |
| | 0,15 | 0,2% | Grünlandbrache |
| | 0,05 | 0,1% | Acker |
| | 0,05 | 0,1% | naturnahe Teiche |
| | 0,05 | 0,0% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,04 | 0,0% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,04 | 0,0% | naturferne Teiche |
| | 0,02 | 0,0% | Nassweide |
| | 96,07 | | |
| Gehölzbestände außerhalb des Waldes | | | |
| Baumhecken | 108,23 | 75,8% | Baumhecken |
| | 6,67 | 4,7% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 4,20 | 2,9% | Freizeitgelände |
| | 4,05 | 2,8% | sonstige Laubwälder |
| | 2,81 | 2,0% | Grünlandbrache |
| | 2,56 | 1,8% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 2,53 | 1,8% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 1,88 | 1,3% | eutrophe Nassbrachen |
| | 1,81 | 1,3% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 1,55 | 1,1% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 1,28 | 0,9% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 1,12 | 0,8% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 1,01 | 0,7% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,84 | 0,6% | Trockenbrachen |
| | 0,56 | 0,4% | magere Fettweide |
| | 0,42 | 0,3% | naturferne Teiche |
| | 0,31 | 0,2% | Acker |
| | 0,30 | 0,2% | Nassweide |
| | 0,25 | 0,2% | Schlagfluren |
| | 0,23 | 0,2% | naturnahe Teiche |
| 0,07 | 0,1% | Nasswiese | |
| 0,02 | 0,0% | Pfeifengrasbestände | |
| | 142,70 | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|---|----------------|---------------------|---|
| Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer | 68,03 | 82,4% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 3,78 | 4,6% | Baumhecken |
| | 3,34 | 4,0% | Freizeitgelände |
| | 1,27 | 1,5% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 1,23 | 1,5% | Grünlandbrache |
| | 1,02 | 1,2% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,92 | 1,1% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,86 | 1,0% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,56 | 0,7% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,44 | 0,5% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,43 | 0,5% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,24 | 0,3% | sonstige Laubwälder |
| | 0,19 | 0,2% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,12 | 0,1% | Trockenbrachen |
| | 0,06 | 0,1% | magere Fettweide |
| | 0,05 | 0,1% | naturnahe Teiche |
| | 0,03 | 0,0% | Nassweide |
| | 0,01 | 0,0% | Schlagfluren |
| | 0,01 | 0,0% | Nasswiese |
| | 0,01 | 0,0% | naturferne Teiche |
| 82,59 | | | |
| Nassbrachen, feucht-frisch | | | |
| mesotrophe Nassbrachen | 21,10 | 51,1% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 6,16 | 14,9% | Baumhecken |
| | 4,18 | 10,1% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 2,44 | 5,9% | eutrophe Nassbrachen |
| | 1,37 | 3,3% | Nasswiese |
| | 0,97 | 2,4% | Grünlandbrache |
| | 0,90 | 2,2% | Nassweide |
| | 0,84 | 2,0% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,77 | 1,9% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,45 | 1,1% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,42 | 1,0% | Freizeitgelände |
| | 0,36 | 0,9% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,32 | 0,8% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,22 | 0,5% | Trockenbrachen |
| | 0,21 | 0,5% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,20 | 0,5% | sonstige Laubwälder |
| | 0,12 | 0,3% | naturnahe Teiche |
| | 0,08 | 0,2% | magere Fettweide |
| | 0,05 | 0,1% | naturferne Teiche |
| | 0,05 | 0,1% | Acker |
| | 0,04 | 0,1% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,02 | 0,1% | Schlagfluren |
| 0,01 | 0,0% | Pfeifengrasbestände | |
| 41,27 | | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|--|----------------|----------------------------------|---|
| eutrophe Nassbrachen | 14,83 | 26,0% | Baumhecken |
| | 12,25 | 21,5% | eutrophe Nassbrachen |
| | 9,22 | 16,2% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 7,27 | 12,8% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 2,45 | 4,3% | Grünlandbrache |
| | 1,63 | 2,9% | Freizeitgelände |
| | 1,47 | 2,6% | Trockenbrachen |
| | 1,47 | 2,6% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 1,36 | 2,4% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 1,29 | 2,3% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,83 | 1,5% | Nassweide |
| | 0,81 | 1,4% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,79 | 1,4% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,65 | 1,1% | Acker |
| | 0,19 | 0,3% | naturnahe Teiche |
| | 0,16 | 0,3% | Nasswiese |
| | 0,13 | 0,2% | magere Fettweide |
| | 0,08 | 0,1% | sonstige Laubwälder |
| | 0,06 | 0,1% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,03 | 0,0% | Schlagfluren |
| 0,02 | 0,0% | naturferne Teiche | |
| 0,00 | 0,0% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald | |
| 56,98 | | | |
| Wirtschaftsgrünland | | | |
| Wiesenfuchsschwanz- Kriechhahnenfuß- wiese | 74,10 | 36,8% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 34,11 | 17,0% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 16,57 | 8,2% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 15,98 | 7,9% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 15,80 | 7,9% | Grünlandbrache |
| | 11,34 | 5,6% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 8,17 | 4,1% | Baumhecken |
| | 7,68 | 3,8% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 4,39 | 2,2% | eutrophe Nassbrachen |
| | 3,22 | 1,6% | Freizeitgelände |
| | 2,84 | 1,4% | magere Fettweide |
| | 2,16 | 1,1% | Nasswiese |
| | 1,27 | 0,6% | sonstige Laubwälder |
| | 1,13 | 0,6% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 1,09 | 0,5% | Acker |
| | 0,46 | 0,2% | Nassweide |
| | 0,34 | 0,2% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,17 | 0,1% | naturnahe Teiche |
| | 0,15 | 0,1% | Trockenbrachen |
| | 0,10 | 0,0% | naturferne Teiche |
| 0,03 | 0,0% | Schlagfluren | |
| 0,02 | 0,0% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald | |
| 201,11 | | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|---|
| Glatthaferwiese, typisch | 18,46 | 24,8% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 17,39 | 23,4% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 7,99 | 10,7% | Baumhecken |
| | 7,71 | 10,4% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 6,35 | 8,5% | Grünlandbrache |
| | 3,37 | 4,5% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 3,33 | 4,5% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 2,37 | 3,2% | magere Fettweide |
| | 2,14 | 2,9% | Freizeitgelände |
| | 1,79 | 2,4% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,82 | 1,1% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,56 | 0,7% | Acker |
| | 0,48 | 0,6% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,42 | 0,6% | Nasswiese |
| | 0,38 | 0,5% | sonstige Laubwälder |
| | 0,37 | 0,5% | Nassweide |
| | 0,25 | 0,3% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,12 | 0,2% | Trockenbrachen |
| | 0,04 | 0,1% | Pfeifengrasbestände |
| | 0,03 | 0,0% | naturferne Teiche |
| 0,01 | 0,0% | naturnahe Teiche | |
| 74,35 | | | |
| Glatthaferwiese, mager, artenreich | 21,99 | 54,1% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 3,69 | 9,1% | Baumhecken |
| | 3,29 | 8,1% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 2,94 | 7,2% | Grünlandbrache |
| | 2,35 | 5,8% | magere Fettweide |
| | 1,79 | 4,4% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,88 | 2,2% | Nasswiese |
| | 0,74 | 1,8% | Nassweide |
| | 0,62 | 1,5% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,43 | 1,1% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,42 | 1,0% | Freizeitgelände |
| | 0,38 | 0,9% | sonstige Laubwälder |
| | 0,30 | 0,7% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,20 | 0,5% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,19 | 0,5% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,12 | 0,3% | Trockenbrachen |
| | 0,11 | 0,3% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,11 | 0,3% | Acker |
| | 0,08 | 0,2% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,02 | 0,0% | Waldbinsensumpf |
| 40,65 | | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|---------------------|----------------|-------|---|
| Nasswiese | 3,37 | 29,0% | Nasswiese |
| | 2,17 | 18,7% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 1,14 | 9,9% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 1,06 | 9,2% | Nassweide |
| | 0,73 | 6,3% | Grünlandbrache |
| | 0,69 | 6,0% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,62 | 5,4% | Baumhecken |
| | 0,50 | 4,3% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,34 | 2,9% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,23 | 1,9% | Freizeitgelände |
| | 0,22 | 1,9% | Waldbinsensumpf |
| | 0,21 | 1,8% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,12 | 1,1% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,12 | 1,1% | magere Fettweide |
| | 0,04 | 0,4% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,01 | 0,1% | sonstige Laubwälder |
| | 0,00 | 0,0% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,00 | 0,0% | Pfeifengrasbestände |
| 11,59 | | | |
| Waldbinsensumpf | 0,28 | 46,3% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,10 | 15,9% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,06 | 9,9% | Nasswiese |
| | 0,05 | 9,0% | Grünlandbrache |
| | 0,05 | 7,9% | Baumhecken |
| | 0,02 | 3,5% | sonstige Laubwälder |
| | 0,02 | 3,5% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,02 | 3,2% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,00 | 0,7% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,60 | | |
| Pfeifengrasbestände | 0,20 | 51,1% | Pfeifengrasbestände |
| | 0,17 | 44,0% | Baumhecken |
| | 0,01 | 3,5% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,01 | 1,9% | Nasswiese |
| | 0,00 | 0,0% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,39 | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|---|
| Nassweide | 3,62 | 25,4% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 2,34 | 16,5% | Nassweide |
| | 2,02 | 14,2% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 1,67 | 11,7% | eutrophe Nassbrachen |
| | 1,18 | 8,3% | Baumhecken |
| | 0,94 | 6,6% | Grünlandbrache |
| | 0,67 | 4,7% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,48 | 3,3% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,37 | 2,6% | Nasswiese |
| | 0,32 | 2,2% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,26 | 1,8% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,12 | 0,9% | magere Fettweide |
| | 0,07 | 0,5% | Freizeitgelände |
| | 0,07 | 0,5% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,06 | 0,4% | sonstige Laubwälder |
| | 0,03 | 0,2% | Acker |
| | 0,01 | 0,1% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,00 | 0,0% | naturferne Teiche |
| 14,23 | | | |
| Fettweide (Dauerweide) | 54,82 | 35,9% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 19,38 | 12,7% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 15,54 | 10,2% | Grünlandbrache |
| | 13,54 | 8,9% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 8,88 | 5,8% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 8,62 | 5,7% | Baumhecken |
| | 8,40 | 5,5% | magere Fettweide |
| | 7,30 | 4,8% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 6,10 | 4,0% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 4,10 | 2,7% | Nassweide |
| | 1,79 | 1,2% | Freizeitgelände |
| | 1,13 | 0,7% | sonstige Laubwälder |
| | 1,12 | 0,7% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,67 | 0,4% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,58 | 0,4% | Nasswiese |
| | 0,17 | 0,1% | Acker |
| | 0,17 | 0,1% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,09 | 0,1% | naturnahe Teiche |
| 0,07 | 0,0% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald | |
| 0,04 | 0,0% | naturferne Teiche | |
| 152,53 | | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|-----------------------|----------------|-------------------|---|
| magere Fettweide | 3,47 | 57,3% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 1,68 | 27,7% | magere Fettweide |
| | 0,52 | 8,6% | Baumhecken |
| | 0,14 | 2,3% | Nassweide |
| | 0,06 | 1,0% | Acker |
| | 0,06 | 1,0% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,04 | 0,7% | Freizeitgelände |
| | 0,03 | 0,5% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,02 | 0,3% | Nasswiese |
| | 0,01 | 0,2% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,01 | 0,2% | Grünlandbrache |
| | 0,01 | 0,2% | Glatthaferwiese, typisch |
| 6,06 | | | |
| Borstgrasrasen | 0,26 | 34,1% | sonstige Laubwälder |
| | 0,20 | 26,7% | Baumhecken |
| | 0,14 | 18,4% | Grünlandbrache |
| | 0,13 | 17,7% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,02 | 2,5% | magere Fettweide |
| | 0,01 | 1,0% | Nasswiese |
| 0,75 | | | |
| Grünlandbrache | | | |
| Grünlandbrache | 9,84 | 29,8% | Baumhecken |
| | 9,54 | 28,9% | Grünlandbrache |
| | 1,87 | 5,7% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 1,75 | 5,3% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 1,66 | 5,0% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 1,47 | 4,4% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 1,41 | 4,3% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,99 | 3,0% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,95 | 2,9% | Acker |
| | 0,61 | 1,9% | Freizeitgelände |
| | 0,60 | 1,8% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,58 | 1,8% | magere Fettweide |
| | 0,53 | 1,6% | Nassweide |
| | 0,34 | 1,0% | sonstige Laubwälder |
| | 0,26 | 0,8% | Trockenbrachen |
| | 0,25 | 0,8% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,16 | 0,5% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,12 | 0,4% | Nasswiese |
| | 0,02 | 0,1% | Pfeifengrasbestände |
| 0,00 | 0,0% | naturferne Teiche | |
| 32,97 | | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|-----------------------|----------------|-------|---|
| Acker | | | |
| Acker | 9,68 | 33,0% | Acker |
| | 6,87 | 23,4% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 3,92 | 13,4% | Grünlandbrache |
| | 2,43 | 8,3% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 1,84 | 6,3% | Baumhecken |
| | 1,42 | 4,8% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,69 | 2,4% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,69 | 2,3% | magere Fettweide |
| | 0,60 | 2,1% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,56 | 1,9% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,24 | 0,8% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,21 | 0,7% | Trockenbrachen |
| | 0,11 | 0,4% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,05 | 0,2% | sonstige Laubwälder |
| | 0,03 | 0,1% | Freizeitgelände |
| | 0,01 | 0,0% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,00 | 0,0% | naturferne Teiche |
| | 29,35 | | |
| sonstige Typen | | | |
| naturferne Teiche | 12,81 | 65,7% | naturferne Teiche |
| | 3,07 | 15,7% | naturnahe Teiche |
| | 2,11 | 10,8% | Freizeitgelände |
| | 0,67 | 3,4% | Baumhecken |
| | 0,24 | 1,3% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,21 | 1,1% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,13 | 0,6% | sonstige Laubwälder |
| | 0,07 | 0,3% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,05 | 0,3% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,04 | 0,2% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,03 | 0,2% | Grünlandbrache |
| | 0,02 | 0,1% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,02 | 0,1% | Nassweide |
| | 0,02 | 0,1% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,01 | 0,1% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,00 | 0,0% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,00 | 0,0% | Nasswiese |
| | 0,00 | 0,0% | magere Fettweide |
| 19,50 | | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|------------------|----------------|-----------|---|
| naturnahe Teiche | 2,03 | 36,0% | naturferne Teiche |
| | 1,21 | 21,4% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 1,19 | 21,1% | naturnahe Teiche |
| | 0,50 | 8,9% | Baumhecken |
| | 0,20 | 3,6% | sonstige Laubwälder |
| | 0,19 | 3,4% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,17 | 3,0% | Freizeitgelände |
| | 0,06 | 1,0% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,04 | 0,7% | Grünlandbrache |
| | 0,02 | 0,3% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,01 | 0,2% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,01 | 0,1% | Nassweide |
| | 0,01 | 0,1% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,00 | 0,0% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,00 | 0,0% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| 5,63 | | | |
| Freizeitgelände | 48,29 | 64,4% | Freizeitgelände |
| | 6,09 | 8,1% | Baumhecken |
| | 5,90 | 7,9% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 3,80 | 5,1% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 1,80 | 2,4% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 1,67 | 2,2% | Grünlandbrache |
| | 1,44 | 1,9% | naturferne Teiche |
| | 1,21 | 1,6% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 1,21 | 1,6% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,87 | 1,2% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,49 | 0,7% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,42 | 0,6% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,39 | 0,5% | naturnahe Teiche |
| | 0,39 | 0,5% | Acker |
| | 0,37 | 0,5% | sonstige Laubwälder |
| | 0,35 | 0,5% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,12 | 0,2% | magere Fettweide |
| | 0,11 | 0,1% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,03 | 0,0% | Nasswiese |
| 0,00 | 0,0% | Nassweide | |
| 74,95 | | | |

| Bestand 1994 | Fläche [ha] | [%] | Bestand 2011 |
|--|----------------|-------------|---|
| Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen | 4,33 | 58,5% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,84 | 11,4% | Baumhecken |
| | 0,35 | 4,7% | sonstige Laubwälder |
| | 0,34 | 4,7% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | 0,33 | 4,5% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,33 | 4,5% | Freizeitgelände |
| | 0,24 | 3,2% | Grünlandbrache |
| | 0,16 | 2,1% | Glatthaferwiese, mager, artenreich |
| | 0,11 | 1,4% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,06 | 0,9% | Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese |
| | 0,06 | 0,8% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,05 | 0,7% | mesotrophe Nassbrachen |
| | 0,05 | 0,7% | Fettweide (Dauerweide) |
| | 0,04 | 0,5% | Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald |
| | 0,03 | 0,4% | Schlagfluren |
| | 0,03 | 0,4% | Acker |
| | 0,02 | 0,3% | Nasswiese |
| | 0,01 | 0,2% | Trockenbrachen |
| 0,01 | 0,1% | Nassweide | |
| | 7,40 | | |
| Trockenbrachen | 1,99 | 52,9% | Baumhecken |
| | 0,81 | 21,7% | Grünlandbrache |
| | 0,43 | 11,4% | Trockenbrachen |
| | 0,19 | 5,2% | Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer |
| | 0,16 | 4,2% | eutrophe Nassbrachen |
| | 0,11 | 2,8% | Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen |
| | 0,03 | 0,8% | Freizeitgelände |
| | 0,02 | 0,5% | Acker |
| | 0,02 | 0,4% | Glatthaferwiese, typisch |
| | 0,00 | 0,0% | Forste und standortfremde Gehölze |
| | | 3,75 | |